

Point sur la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque au CH de Chartres: Preuves et THM

Dr ALBERT et C. Laur



La télésurveillance en cardiologie chez Air Liquide HealthCare



- Premier patient confié en février 2018
- 3 000 patients pris en charge / CHU 36% / CH 37% / 17% libéraux
- Une implantation nationale avec plus de 150 centres partenaires
- Plus de 3000 patients télé surveillés
- Expérience de proximité et flexibilité : Coeur de metier
- Equipe : commercial de terrain et pilier humain (10 personnes)
- Gain temps médecin : gestion des alertes 75% en amont
- Tablette et balance connectées avec carte SIM paramétrée (pas besoin smartphone , pts âgés)

Une expertise avérée dans l'accompagnement des patients Insuffisant cardiaques : preuves publiées



TIM HF 2
publiée




OSICAT / Pr Galinier CHU toulouse



PIMPS

- ***257 patients inclus du 23/03/2018 au 07/06/2020***
- ***Environ 10 patients / mois***
- ***228 patients activés = 90 %***
- ***100 % des suivis 1 an réalisés = 100 patients***
- ***60 % des patients télésuivis pendant 1 an n'ont pas été réhospitalisés dans l'année suivant la mise en place de la télésurveillance***
- ***Durée moyenne par réhospitalisation = 5 jours.***

Analyse comparative effectuée à partir de la base PMSI :



La TLS permet une prise en charge plus précoce des patients (patients moins graves)

+ La TLS favorise un retour au domicile plus fréquent (- de convalescence)

+ La TLS favorise la réhospitalisation directe dans le service (car patient suivi) et donc une baisse du passage par les urgences

+ La TLS favorise le recours aux consultations anticipées

= Impact favorable sur la DMS et diminution des réhospitalisations

Durant la période COVID :

- ***Patients rassurés car suivi à distance***
- ***Maintien d'une surveillance médicale personnalisée***
- ***Adaptation à distance des ordonnances***
- ***Activité maintenu en télétravail***
- ***Poursuite des inclusions durant hospitalisation***
- ***Diminution des durée hospitalisation (moins exposition potentiel)***

Durant la période COVID :

Arrêté publié le 24 Mars au JO dans le cadre exceptionnel de lutte contre l'épidémie de Covid-19:

- ***Mesures applicables durant l'état d'urgence sanitaire***
- ***Par dérogation, les patients éligibles n'ont pas à remplir une des deux conditions suivantes:***
 - ***hospitalisation au cours des 30 derniers jours pour une poussée d'insuffisance cardiaque chronique***
 - ***hospitalisation au moins une fois au cours des 12 derniers mois pour une poussée d'insuffisance cardiaque chronique.***
- ***Ce texte doit permettre de faciliter le recours à la télésurveillance de ces patients à risque, tel qu'encouragé par les pouvoirs publics.***
- ***Avenir : IPA protocole de coopération avec les IDE / gestion des alertes***

L'analyse de notre activité ...286 pts

... qu'en est-il de la satisfaction des patients?

Questionnaire télé IC	Données manquantes	Effectif	Pourcentage
Satisfaction de la télésurveillance	20		
<i>Pas d'avis</i>		5	1,72
<i>Non satisfait</i>		5	1,72
<i>Satisfait</i>		194	66,67
<i>Très satisfait</i>		87	29,90
TLS permet de mieux gérer la maladie	16	277	93,90
Note moyenne de recommandation, m(SD)	7	304	8,24 (1,21)
Classe de recommandation	7		
<i>Certainement pas</i>		1	0,33
<i>Probablement pas</i>		17	5,59
<i>Probablement</i>		162	53,29
<i>Certainement</i>		124	40,79
Motif recommandation si ≥ 7 (N = 286)	2		
<i>Facilité d'emploi</i>		10	3,52
<i>Meilleur suivi (rassuré)</i>		59	20,77
<i>Facilité d'emploi + Meilleur suivi (rassuré)</i>		120	42,25
<i>Facilité d'emploi + Meilleur suivi (rassuré) + Meilleur état de santé</i>		59	20,79
<i>Facilité d'emploi + Meilleur état de santé</i>		2	0,70
<i>Meilleur suivi (rassuré) + Meilleur état de santé</i>		29	10,21
<i>Meilleur état de santé</i>		5	1,76
Motif recommandation si < 7 (N = 25)	7		
<i>Pas d'amélioration de l'état de santé</i>		1	5,56
<i>Trop contraignant (pas le temps)</i>		10	55,56
<i>Pas d'amélioration de l'état de santé + Trop contraignant (pas le temps)</i>		1	5,56
<i>Trop contraignant (pas le temps) + Trop d'interlocuteur (trop de suivi)</i>		2	11,11
<i>Trop d'interlocuteur (trop de suivi)</i>		1	5,56
<i>Trop technique</i>		2	11,11
<i>Trop contraignant, trop technique</i>		1	5,56

96 % des patients sont satisfait ou très satisfait

94 % des patients pensent que la TLS permet de mieux gérer la maladie

94 % des patients recommandent la TLS

Motif de recommandation principal = meilleur suivi (rassure +++)

Motif de non recommandations principal = Trop contraignant