Les WEBINARS du CNCH

"Quid de l'angioplastie coronaire d'une bifurcation à deux stents »

Avec le soutien institutionnel de "TERUMO"

17 Décembre 2020

Grégoire Rangé, Pascal Motreff

Cas clinique

- Homme 70 ans
- FDRCV : Diabète, HTA, Dyslipidémie, Surpoids
- Antécédents :
 - ✓ AC/FA sous Apixaban
 - ✓ AVCI multiples (hémiparésie et dysarthrie séquellaire)
 - ✓ AOMI : ATL FS, poplitée et tronc tibio-péronier, amputation cuisse gauche, amputation 2 orteils pied droit
 - ✓ IRC (DFG 45ml/mn)
- Hospitalisé pour insuffisance cardiaque, Troponine +
- FEVG 50%

Décision ?

- Medina 1/1/1
- Score SYNTAX: 24
- Euroscore : 5,1%
- Comorbidités

Problématique

Angioplastie de bifurcation coronaire à 2 stents

- A réserver aux bifurcations complexes,
aux bifurcations à grosses branches
80-90% des bifurcations sont traitées avec un seul stent
Moins il y a de stents, meilleur est le pronostic...
- Parfaitement analyser la lésion et prédéfinir une stratégie
- Connaître toutes les techniques disponibles, limites et avantages
- Connaître son matériel
- Tirer enseignement des études sur Banc
- Profiter de l'imagerie endocoronaire

Angioplastie du Tronc Commun

Périlleuse, niveau d'exigence maximal
Lésions complexes, difficile à analyser
Souvent distale, **Bifurcation dans 80 %**
Gros diamètres, disparités de calibres

TC = 5,3 % des ATL

Classification Medina

68% fin de TC + au moins un ostium

Se méfier des refus de bifurcation dans autres cas

ABCD classification for coronary artery bifurcation disease

Disparités de calibre susceptibles d'infléchir la stratégie

Significant lesion?*

A/a=Left main stem (LMS)
 B/b=Left Anterior Descending (LAD)
 C/c=Left Circumflex artery (LCx)
D/d=Intermediate branch (IM)

Vessel diameter

≥3.5mm: Upper case (e.g. A)

<3.5mm: Lower case (e.g. a)

ABC

AbC

Bc

Abc

ABcd

Bcd

* ≥70% reduction in lumen or according to FFR or other resting indices, cCT-cFFR, IVUS, OCT

Classification MADS de quoi devenir fou ?

Classification MADS

techniques les plus utilisées

Classification MADS

techniques les plus utilisées

Toujours finir par un kissing quand il y a deux stents

Current Interventions for the Left Main Bifurcation

Tanveer Rab, MD,^a Imad Sheiban, MD,^b Yves Louvard, MD,^c Fadi J. Sawaya, MD,^d Jun Jie Zhang, MD,^e Shao Liang Chen, MD^e

Algorithm for Left Main Bifurcation Intervention

FIGURE 4 Choices for Second Stent in Provisional Stenting

FIGURE 2 Provisional Stenting With Single Stent Crossover

T-Stenting

FIGURE 3 T-Stenting and Minimal Protrusion

TAP

Impact de l'imagerie sur le pronostic

Recommandations of the adjunctive use of intravascular imaging for diagnostic evaluation of coronary artery disease, guidance and optimization of PCIs

Diagnostic assessment of coronary lesions

Consensus opinion	Angiographically unclear/ambiguous findings (e.g. dissection, thrombus, calcified nodule)
	Assessment of left main stenosis ←
	Complex bifurcation lesions
	Suspected culprit lesion of ACS

PCI guidance and optimization

RCT evidence	Long lesions
	Chronic total occlusions
Consensus opinion	Patients with acute coronary syndromes
	Left main coronary artery lesions ←
	Two stents bifurcation
	Implantation of bioresorbable scaffolds
	Patients with renal dysfunction (IVUS)

Identification of mechanism of stent failure ←

Restenosis
Stent thrombosis

An expert consensus document of the EAPCI

L. Raber, Eurointervention 2018

R. Bing, JACC Cardiovasc Interv 2015

Impact de l'imagerie sur le pronostic

Intravascular Imaging improves long term prognosis

Meta-analysis of 8 Randomized Trials of IVUS vs Angio-Guided DES Implantation

Events	IVUS events	Angio events	OR	95% CI	P-value
MACE	6.5%	10.3%	0.59	0.46-0.76	<0.0001
CV mortality	0.5%	1.2%	0.46	0.21-1.00	0.05
MI	0.9%	1.6%	0.58	0.30-1.11	0.10
TLR	4.1%	6.6%	0.60	0.43-0.84	0.003
TVR	5.5%	8.7%	0.61	0.41-0.91	0.02
ST	0.6%	1.3%	0.49	0.24-0.99	0.04

MACE Mortality ÷ 2 Stent Thrombosis

Elgendy et al. Circ Cardiovasc Interv 2016

Impact de l'imagerie sur le pronostic

Foerst J. JGIN 2012

PCI Strategy & PCI Guiding

Impact de l'imagerie sur le pronostic

DES follow-up @ 3 months (under DAPT + oral anticoagulant)

Post-PCI & Follow-up

- **OCT-guided LM PCI using Xience EES (n=70)**
- Standardized OCT analysis plan
- **Bifurcation technique** (1 vs. 2 stents , POT/Side/RePOT vs. POT/Kiss, compliant vs. non compliant balloons ...) **was left at the discretion of the operator**

Influence of OCT analysis on PCI flow

Wire repositioning
after run#2

15 %

PCI optimization
(Post dilation, etc..) after run#3

26 %

Inadequate wire position

Enseignements du Banc

Stenting - POT - Kissing

Ø4-3-3

TERUMO

Stenting POT- Side -POT ou REPOT

Finet G, JACC Cardiovasc Interv. 2015

Sawaya FJ, JACC Cardiovasc Interv 2016

Stenting POT- Side -POT ou REPOT

Comparative Analysis of Sequential Proximal Optimizing Technique Versus Kissing Balloon Inflation Technique in Provisional Bifurcation Stenting

Fractal Coronary Bifurcation Bench Test

Finet G, JACC Cardiovasc Interv. 2015

CONCLUSIONS In comparison with 5 other techniques, the re-POT sequence significantly optimized the final result of provisional coronary bifurcation stenting, maintaining circular geometry while significantly reducing SB ostium strut obstruction and global strut malapposition. These experimental findings confirm that provisional stenting may be optimized more effectively without KBI using re-POT. (J Am Coll Cardiol Intv 2015;8:1308-17)

Stenting POT- Side -POT ou REPOT

CORONARY INTERVENTIONS

Influence of platform design of six different drug-eluting stents in provisional coronary bifurcation stenting by rePOT sequence: a comparative bench analysis

Derimay F, Eurointervention 2017

Benefit of a new provisional stenting strategy, the re-proximal optimisation technique: the rePOT clinical study

Derimay F, Eurointervention 2018

REPOT

« ça marche avec tous les stents »
« efficace sur banc et en clinique »

- 106 pts
- 40% TC
- <1% TLR à 6 mois

Impact de l'imagerie sur le pronostic

PCI Strategy & PCI Guiding

**Benefit of a new provisional stenting strategy,
the re-proximal optimisation technique :
The rePOT clinical study**

Derimay F, Eurointervention 2018

rePOT

« Showed the benefit of the rePOT sequence in provisional stenting, **replicating in vivo the excellent in vitro geometric results previously reported**, and confirming ease of implementation and medium-term safety »

- 106 pts, 40% Left Main
- <1% TLR @ 6 months

Expérience et volume de pratique

ESC

European Society
of Cardiology

European Heart Journal (2019) 40, 87–165
doi:10.1093/eurheartj/ehy394

ESC/EACTS GUIDELINES

2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization

It should be considered that PCI for LM be performed by trained operators with an annual volume of ≥ 25 LM PCI cases per year.

IIa

C

3 opérateurs dans un centre,
75 TC (5% des procédures),
volume de 1500 angioplasties.../an

Haut volume, expérience, compagnonnage, maîtriser les techniques

Décision d'ATL

- Score SYNTAX: 24
- Euroscore : 5,1%
- Co-morbidité

Medina ?

- 1/1/1

Quelle technique ?

- T stenting
- DK Crush
- Culotte

T-Stenting ou TAP

Culotte

DK Crush Stenting

Pourquoi j'évite le DK crush?

« La simplicité, c'est la sophistication suprême »

Léonard de Vinci

Pourquoi j'évite le DK crush?

Je préfère le T ou TAP stenting

- Parce que c'est simple et rapide
- 1 seule couche de stent
- Franchissement SB plus simple

Je choisis le T ou TAP stenting en fonction de l'angulation, de la lésion ostiale...

SB recrossing

Post kissing

→ TAP

→ T

En cas de T stenting, ouvrir la cellule la plus distale

Proximal crossing

Distal crossing

Intérêt majeur du POT

- Apposer stent sur segment proximal en respectant la loi fractale
- Eviter crush (guide extrastent)
- Faciliter ouverture en direction collatérale

Intérêt majeur du POT

Réussir son POT

- SCB ou NCB au diamètre adapté
- Position optimale du ballon
- Eviter effet « bottle neck »

Choix du stent 1 adapté :

- longueur lésion
- en taille du ballon du POT (min 6 mm)

FIGURE 4 Proximal Optimization Technique

Sawaya FJ, JACC Cardiovasc Interv 2016

FIGURE 2 Balloon Positioning for the POT

Finet G, JACC Cardiovasc Interv. 2015

Eviter les pièges et complexité du DK

FIGURE 7 Inferior Results After Final Kissing Balloon Inflation in Culotte Stenting Compared With Double Kissing Crush Stenting of Left Main Coronary Artery Bifurcation

Le DK ...m'empêche de dormir

Un peu complexe...

Pourquoi je fais un DK crush?

Résultats cliniques impressionnant !

DK crush V

Stent SB : 47 %

If DS >75% , dissection B or TIMI < 3

MACE à 3 ans : PS vs DK-crush

Number at risk

PS group	242	232	222	206	201	200	194
DK group	240	235	226	220	217	215	213

Number at risk

PS group	242	236	236	232	228	228	223
DK group	240	237	233	231	228	226	224

Thrombosis de stent PS vs DK-crush

Bénéfice sur TLF majoré si lésions complexes

Critiques de DK crush 5

- C'est des centres hyper sélectionnés !

26 centres

- C'est des chinois !

Chine , EU , Thaïlande, Indonésie, Italie

- C'est des centres experts !

Exigences : 20 TC / an et 3 DK Crush avant rando

- Etude isolée ...

Clinical Outcomes Following Coronary Bifurcation PCI Techniques

A Systematic Review and Network Meta-Analysis Comprising 5,711 Patients

CENTRAL ILLUSTRATION Network Plot and Forest Plot for the Primary Outcome of Interest

Di Gioia, G. et al. *J Am Coll Cardiol Interv.* 2020;13(12):1432-44.

(Left) Network plot. The widths of **connecting lines** between different treatment nodes reflect the number of studies available for each comparison. The size of each **circle** reflects the number of patients randomized to each treatment node. **(Right)** Forest plot and relative treatment effects for the primary outcome of interest. Treatment effects are reported as odds ratios (ORs) with 95% credibility intervals (CrIs) compared with the provisional strategy, used as a reference. An OR >1 favors the provisional strategy, while an OR <1 favors the other technique. DK-crush = double-kissing crush; MACE = major adverse cardiovascular events; T/TAP = T stenting/T and protrusion.

Clinical Outcomes Following Coronary Bifurcation PCI Techniques

A Systematic Review and Network Meta-Analysis Comprising 5,711 Patients

FIGURE 2 Network Meta-Analysis Forest Plots for the Secondary Outcomes of Interest

CrI = credible interval; DK-crush = double-kissing crush; MACE = major adverse cardiovascular events; OR = odds ratio; T/TAP = T stenting/T and protrusion.

Pourquoi c'est mieux ?

Meilleur couverture de stent = moins de RIS PS vs DK-crush

FIGURE 3 Distribution of ISR

The rates of in-stent restenosis (ISR) in the main vessel (MV) at 13-month angiographic follow-up were comparable with DK crush stent and provisional stenting (PS). The rate of ISR at the ostium of side branch (SB) was 12.0% with PS versus 5.0% with DK crush ($p = 0.09$). LM = left main.

Sécurise branche fille +++
Car stenting SB d'emblée
(lève la sténose serrée de SB)

Critiques du DK crush

- C'est compliqué ?

Chartres s'y est mis , donc ...

10 étapes pour TAP vs 11 étapes DK crush

- Difficile de franchir SB ?

Oui pour Crush classique (double couche de stent)

Non pour DK (ou SK) crush = T stenting

Car franchissement d'une seule couche de stent / étape

TABLE 3 Procedural Characteristics

	Provisional Stent (n = 242)	DK Crush Stent (n = 240)	p Value
Angiographic success	235 (97.1)	236 (98.3)	0.54

SK CRUSH technique (sur banc)

DK crush ou SK crush ?

Ou simple ouverture de maille ?

Les variantes du DK crush

Classic Crush Technique

Mini Crush Technique

Nanocrush

Les inconvénients

- Plus compliqué : Formation +++
- Plus long
- Plus de contraste et Rx

TABLE 3 Procedural Characteristics

	Provisional Stent (n = 242)	DK Crush Stent (n = 240)	p Value
Procedural time, min	66.1 ± 34.5	81.9 ± 37.6	<0.001
Contrast volume, ml	190.9 ± 73.8	226.7 ± 81.4	<0.001

Pourquoi le T ou tap stenting
c'est pas terrible !

PS : SB non sécurisée

Plaque shifting

T-shape

- Difficult SB access
- Less plaque shifting
- T-stenting better

Y-shape

- Easier SB access
- More plaque shifting
- Culotte or crush better

Source: Habib Samady, William F. Fearon, Alan C. Yeung, Spencer B. King III: *Interventional Cardiology*, 2nd Edition. Copyright © McGraw-Hill Education. All rights reserved.

Provisional stenting

= 9 % d'échec de franchissement SB * / Bif

* JACC. *Cardiovascular Interventions*, 26 Mar 2015, 8(4):536-546

Limites du T ou Tap stenting

T ou Tap : pas facile !

Proximal crossing

Distal crossing

20 % d'échec de franchissement de maille distale dans LEMON

Provisional stenting

Le piège du guide piégé

Le piège du guide piégé

Compaction de stent

DK crush
aucun guide piégé = aucun risque

compaction proximale du stent

Quand privilégier DK ?

- Lésion complexe (1,1,1 ou 0,1,1)
- Sténose SB > 70 %
- Angle fermé < 70°
- Patient stable (durée plus longue)
- Patient peu fragile (FE / I rénale)
- Maîtrise de la technique (learning curve 5-10)

Suite du Cas Clinique

Décision d'ATL

- Score SYNTAX: 24
- Euroscore : 5,1%
- Co-morbidité

Classification

- Medina : 1/1/1
- ABCd

Quelle technique ?

Suite du Cas Clinique

Ballon IVA en aval

Positionnement stent TC-Cx
TANSAI 3,0 x 28

Contrôle angio:
Vérifier absence dissection avant retrait guide

Ultimaster™ Tansei™

Stent coronaire à libération de sirolimus

GRANDE CAPACITÉ DE SUREXPANSION - Diamètre du stent (mm)

ACCÈS FACILE À LA BRANCHE LATÉRALE³

Ø 2,25-3,0 mm

Cathéter à ballonnet non compliant
Ø 4,0 mm, pression nominale

Ø 3,5-4,0 mm

Cathéter à ballonnet non compliant
Ø 5,0 mm, pression nominale

TECHNOLOGIE DE REVÊTEMENT À GRADIENT POUR MAINTENIR L'INTÉGRITÉ DU POLYMÈRE, MÊME EN CAS DE SUREXPANSION⁴

Ø4,0-12 mm Ultimaster Tansei
a une expansion max. de 5,5 mm¹

Grossissement 150x

Pas de revêtement de principe actif sur les parties du stent qui subissent le plus de contraintes physiques

DAPT 1 MOIS⁵

Inclus dans la notice pour les patients devant arrêter la bithérapie précocement⁶

1. L'agrément CE a été reçu le 2 août 2019. La notice sera mis à jour afin de refléter les limites post-dilatation spécifiées. 2. Ng J et al. Int J Cardiol 2016;221:171-9. 3. Test ISCD-523-31-34 réalisé et consigné par Terumo Corporation - Méthode de test : dilater une cellule avec un ballonnet à la pression nominale. 4. Saito N et al. Medical Devices: Evidence and Research 2016;9:33-43. 5. Les patients doivent poursuivre un traitement antiplaquettaire postopératoire cliniquement adapté conformément aux directives en vigueur. Si nécessaire, le double traitement antiplaquettaire peut être arrêté précocement mais pas avant un mois. 6. Notice de l'Ultimaster™ Tansei™, version 01-2018.

Ultimaster™ Tansei™, endoprothèse coronaire à libération de Sirolimus est indiquée pour améliorer la perfusion au niveau du myocarde chez les patients atteints de lésions sténotiques des artères coronaires. Ultimaster Tansei est exclusivement réservé aux professionnels de santé. Dispositif médical de classe III (CE 0482) fabriqué par Terumo Europe NV, Belgique. Fait l'objet d'une prise en charge au titre III de la liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) prévue par l'article L165-1 du code de la sécurité sociale sous les codes : Ultimaster™ Tansei™ Ø 2,25mm, code LPP : 3159907, Ultimaster™ Tansei™ Ø 2,50mm, code LPP : 314840, Ultimaster™ Tansei™ Ø 2,75mm, code LPP : 3153856, Ultimaster™ Tansei™ Ø 3,00mm, code LPP : 3129728, Ultimaster™ Tansei™ Ø 3,50mm, code LPP : 3163398, Ultimaster™ Tansei™ Ø 4,00mm, code LPP : 3199580.

Positionnement ballon IVA pour crush

Retrait guide Cx avant crush

CRUSH

Refranchissement Cx

Ouverture maille Cx

Passage stent TC-IVA
TANSAI 3,5 x 18

Retrait guide Cx

POT

2^{ème} franchissement Cx

Kissing

POT final
Ballon 4,5

Résultat final

Règles d'Or du DK Crush

- Connaître parfaitement la technique et les différentes étapes
 - Formation ++
- Réservée aux vraies bif : Médina 1,1,1 et 0,1,1
- ATL programmée, patient et famille informée
- Prétraitée AAP / ACT guidée (modif sous apixaban ??)
- 7 Fr si possible
- 2 opérateurs
- 2 règles d'or
 - Ballon du crush neuf sur ou en aval du stent à crusher (positionné avant le crush ++)
 - Retrait du guide dans branche fille avant chaque crush +++

Résultat

- Procédure
 - Durée procédure : 55 min
 - Temps de scopie: 17 min
 - Iode: 142 cc
 - Air Kerma: 1933 mGy
- Asympto
- ECG non modifié / Trop N
- Sortie J3

Take Home Message

Angioplasties bifurcations complexes

- Jamais ad'hoc
- Connaître techniques et matériel
- Procédures planifiées
- Importance de la formation, expérience et volume de pratique

Merci pour votre attention, Merci à TERUMO

L'atelier by Terumo